



Rejestracja czynna pn-pt 8⁰⁰-18⁰⁰
Rejestracja RTG - tel. 52 36 55 426
Rejestracja TK i MR - tel. 52 36 55 696




Rejestracja e-mail: rejestracja.rtg@biziel.pl
Sekretariat - tel. 52 36 55 412 e-mail: rtg@biziel.pl

Badanie wirtualna kolonoskopia (colon CT)

Wirtualna kolonoskopia to metoda diagnostyki, polegająca na utworzeniu trójwymiarowego modelu jelita grubego od odbytnicy aż do kątnicy, przy użyciu obrazów uzyskanych za pomocą tomografii komputerowej. Zastępuje tradycyjną kolonoskopię, jeśli istnieją przeciwwskazania do jej wykonania. Do powstania obrazów wykorzystuje się promieniowanie rentgenowskie a podczas badania do jelita wprowadza się powietrze za pomocą cienkiej rurki.

{ Niekiedy badanie wymaga również dożylnego podania środka cieniującego, ale o tym informujemy pacjenta w trakcie rejestracji - wówczas obowiązują wymagania jak przy badaniu tomografii komputerowej z kontrastem. }

Przygotowanie do badania WIRTUALNA KOLONOSKOPIA

- należy zabrać ze sobą **poprzednie badania, zdjęcia, wypisy (KSERO)**;
 - należy zabrać ze sobą **poprzednie badania, zdjęcia, wypisy (KSERO)**;
 - **badanie najczęściej nie wymaga dożylnego podania środka cieniującego**;
- ❖ **Dzień przed badaniem:**
przeczyszczenie wg zaleceń lekarza środkiem przeczyszczającym zapisanym na receptce przez lekarza kierującego;
- ❖ **W dniu badania:**
na czczo  
- ❖ pacjenci przyjmujący **leki - zażyć rano** jak co dzień popijając niewielką ilością wody; 

Odbiór wyników

- **osobiście lub za pisemnym upoważnieniem w Rejestracji ZRiDO;**
- **od pn-pt w godz. 8 - 18 - po 3 tygodniach;**

Przygotowanie dodatkowe do badania z kontrastem:

- aktualny wynik poziomu **kreatyniny** tj. badanie z krwi wykonane na 2-7 dni przed badaniem;
- w przypadku **NADCZYNNOCI TARCZYCY**- zaświadczenie od endokrynologa o możliwości dożylnego podania kontrastu do badania;
- w przypadku **CUKRZYCY** u pacjentów z upośledzoną funkcją nerek: jeśli pacjent przyjmuje lek z grupy **METFORMINY** (Avamina, Etform, Formetic, Glucophage, Metfogamma, Metformax, Metforatio, Metformin, Metifor, Metral, Siofor, Symformin) należy lek profilaktycznie **odstawić na 48 godz. przed badaniem i 48 godz. po badaniu** lub skontaktować się z lekarzem POZ lub diabetologiem;