

# Szpitalny Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej

ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

**Pawilon B**

Tel.: rejestracja 52 36 55 645, kierownik: 52 36 55 447

## **POBIERANIE WYMAZÓW W KIERUNKU NOSICIELSTWA/KOLONIZACJI *Streptococcus agalactiae* (GBS – paciorkowiec $\beta$ -hemolizujący grupy B)**

**Zaleca się wykonanie badania przesiewowego w kierunku GBS  
u wszystkich kobiet w 35 – 37 tygodniu ciąży**

### **Zasady ogólne:**

- Nie zaleca się pobierania wymazów z szyjki macicy i stosowania wziernika pochwowego
- Próbkę może pobrać sama kobieta po zapoznaniu się z instrukcją postępowania

### **Kolejność postępowania:**

- Pobrać wymaz najpierw z **przedsionka** pochwy, a następnie po pokonaniu oporu zwieracza z odbytu. Wykorzystuje się tę samą lub dwie różne wymazówki
- Umieścić wymazówkę w probówce z podłożem transportowym
- W przypadku pobrania dwóch osobnych próbek z pochwy i odbytu **obie wymazówki** należy umieścić **w jednej probówce** z podłożem transportowym
- Opisać czytelnie próbkę: imię, nazwisko, data i godzina pobrania
- Na zleceniu badania należy zaznaczyć, że próbka jest przeznaczona do hodowli GBS i umieścić informację o ewentualnej nadwrażliwości na penicylinę

### **Przechowywanie i transport do laboratorium:**

- Próbka w probówce z podłożem transportowym – **do 4 dni w temp. pokojowej lub w lodówce**
- Próbka w probówce bez podłoża transportowego – **do 2 godzin w temp. pokojowej**

### **Wrażliwość na antybiotyki:**

- Wrażliwość *Streptococcus agalactiae* (GBS) na penicylinę G oznacza również wrażliwość na pozostałe antybiotyki  $\beta$ -laktamowe (aminopenicyliny, cefalosporyny i karbapenemy) i nie ma potrzeby wykonywania antybiogramu
- U pacjentek z nadwrażliwością na penicylinę wykonujemy oznaczanie wrażliwości GBS na erytromycynę i klindamycynę