

Świadoma zgoda**na wykonanie próby prowokacji wysiłkiem**

Imię i nazwisko.....

PESEL.....

Powysiłkowy skurcz oskrzeli może zdarzyć się w każdym wieku i dotyczy ok. 12% całej populacji. Próba prowokacji wysiłkiem stosowana jest w rozpoznawaniu astmy wysiłkowej, pokrzywki powysiłkowej. Próba dostarcza dowodu na istnienie związku przyczynowo skutkowego, między wysiłkiem i wystąpieniem objawów nadwrażliwości.

Test przeprowadzamy przy użyciu bieżni, na której pacjent wykonujemy submaksymalny 8-minutowy bieg. Badanie spirometryczne wykonujemy przed oraz w 1, 3, 5, 10 15 i 30 minucie po zakończeniu wysiłku. Przez cały czas trwania próby rejestrowane są przez lekarza objawy, które występują (lub nie).

Próby prowokacji wysiłkiem tak jak wszystkie inne próby prowokacyjne są obciążone ryzykiem związanym z narażeniem organizmu chorego na czynnik powodujący reakcje niepożądane. Do najczęstszych reakcji niepożądanych występujących podczas próby prowokacji zaliczamy: kaszel, wzmożone odkrztuszanie płwociny, świszczący oddech i/lub uczucie ciasnoty w klatce piersiowej, duszność, pokrzywka, zaczerwienie i łzawienie oczu, kichanie, wyciek z nosa, dodatkowo mogą wystąpić bóle brzucha, zmęczenie i złe samopoczucie, uogólniona reakcja anafilaktyczna. Nie można przewidzieć rodzaju i nasilenia reakcji w trakcie próby prowokacji. W przypadku wystąpienia niepożądanych reakcji w trakcie i po próbie prowokacji chory powinien pozostać w szpitalu do następnego dnia w celu obserwacji.

Próba prowokacji wysiłkiem jest jedynym znanym w praktyce klinicznej sposobem diagnozowania astmy wysiłkowej i/lub pokrzywki powysiłkowej.

Ja niżej podpisany(a) oświadczam, że przeczytałem i zrozumiałem informacje dotyczące opisanego próby prowokacji oraz otrzymałem(am) wyczerpujące, satysfakcjonujące mnie odpowiedzi na zadane pytania.

Wyrażam zgodę /nie wyrażam zgody na udział w próbie prowokacji i jestem świadomy (a) faktu, że w każdej chwili mogę cofnąć zgodę bez podania przyczyny.

Data,

Podpis chorego

Podpis lekarza